

## SPÉCIALE MP\* : DEVOIR LIBRE

(1) Dans tout le problème,  $I$  désigne l'intervalle  $[0, 1]$  de  $\mathbb{R}$  et  $I^2 = I \times I$ .

(2)  $\mathcal{C}(I)$  est l'espace vectoriel des fonctions réelles continues sur  $I$ .

On le munit de la norme de la convergence uniforme :

$$\forall f \in \mathcal{C}(I), \|f\| = \sup_{x \in I} |f(x)|.$$

$M(I)$  est l'espace vectoriel des formes linéaires *continues* sur  $\mathcal{C}(I)$ .

On le munit de la norme naturellement associée à celle de  $\mathcal{C}(I)$  :

$$\forall \mu \in M(I), \|\mu\| = \sup_{f \in B_1} |\mu(f)|$$

où  $B_1$  est la boule unité fermée de  $\mathcal{C}(I)$ .

(3)  $\mathcal{C}(I^2)$  est l'espace vectoriel des fonctions réelles continues sur  $I^2$ , muni de la norme de la convergence uniforme :

$$\forall F \in \mathcal{C}(I^2), \|F\| = \sup_{(x,y) \in I^2} |F(x,y)|.$$

$M(I^2)$  est l'espace vectoriel des formes linéaires *continues* sur  $\mathcal{C}(I^2)$  muni de la norme associée :

$$\forall \lambda \in M(I^2), \|\lambda\| = \sup_{F \in B_2} |\lambda(F)|$$

où  $B_2$  est la boule unité fermée de  $\mathcal{C}(I^2)$ .

(4) Soit  $F \in \mathcal{C}(I^2)$ ,  $x \in I$ . On note  $F(x, \cdot)$  l'application partielle

$$y \in I \mapsto F(x, y),$$

$F(x, \cdot)$  appartient donc à  $\mathcal{C}(I)$ .

(5) Soit  $f \in \mathcal{C}(I)$ ,  $g \in \mathcal{C}(I)$ . On désigne par  $f \otimes g$  l'élément de  $\mathcal{C}(I^2)$  défini par la formule :

$$\forall (x, y) \in I^2, (f \otimes g)(x, y) = f(x)g(y).$$

(6) On dit qu'une fonction  $h$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur l'intervalle  $J$  si  $h$  est continue et possède un dérivée continue sur  $J$ .

### PREMIÈRE PARTIE

Pour tout  $f \in \mathcal{C}(I)$ , on pose  $m(f) = \int_0^1 f(x) dx$ .

**I.1.** Montrer que l'application ainsi définie de  $\mathcal{C}(I)$  dans  $\mathbb{R}$  appartient à  $M(I)$  et calculer  $\|m\|$ .

**I.2.** Soit  $a \in I$ . Pour tout  $f \in \mathcal{C}(I)$ , on pose  $\delta_a(f) = f(a)$ .

Montrer que  $\delta_a$  appartient à  $M(I)$ . Calculer  $\|\delta_a\|$ .

Calculer  $\|\delta_a - \delta_b\|$  si  $a$  et  $b$  sont deux éléments distincts de  $I$ .

**I.3.** Calculer  $\|m - \delta_a\|$ .

**I.4.** Montrer que pour tout  $f \in \mathcal{C}(I)$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \delta_{\frac{1}{n}}(f) = \delta_0(f)$ .

La suite  $(\delta_{\frac{1}{n}})_{n \in \mathbb{N}^*}$  a-t-elle une limite dans  $M(I)$  ?

A-t-on une propriété analogue dans  $M(I^2)$  ?

**I.5.** Soit  $\lambda \in M(I^2)$ ,  $\theta \in \mathcal{C}(I)$ . On définit deux applications  $p_\theta(\lambda)$  et  $q_\theta(\lambda)$  de  $\mathcal{C}(I)$  dans  $\mathbb{R}$  par les formules :

$$\begin{aligned}\forall f \in \mathcal{C}(I), p_\theta(\lambda)(f) &= \lambda(f \otimes \theta) \\ \forall f \in \mathcal{C}(I), q_\theta(\lambda)(f) &= \lambda(\theta \otimes f).\end{aligned}$$

Montrer que  $p_\theta(\lambda)$  et  $q_\theta(\lambda)$  appartiennent à  $M(I)$ .

Les applications  $p_\theta$  et  $q_\theta$  ainsi définies de  $M(I^2)$  dans  $M(I)$  sont-elles continues ?

## DEUXIÈME PARTIE

**II.1.** Soit  $F \in \mathcal{C}(I^2)$ ,  $\nu \in M(I)$ . Montrer que l'application  $F_\nu$  de  $I$  dans  $\mathbb{R}$  définie par

$$\forall x \in I, F_\nu(x) = \nu[F(x, \cdot)]$$

appartient à  $\mathcal{C}(I)$ .

Établir l'inégalité  $\|F_\nu\| \leq \|F\| \cdot \|\nu\|$ .

**II.2.** Soit  $\mu \in M(I)$ ,  $\nu \in M(I)$ . On définit une application de  $\mathcal{C}(I^2)$  dans  $\mathbb{R}$ , notée  $\mu \otimes \nu$ , par la formule

$$\forall F \in \mathcal{C}(I^2), \mu \otimes \nu(F) = \mu(F_\nu).$$

**a.** Montrer que  $\mu \otimes \nu$  appartient à  $M(I^2)$ .

**b.** Calculer  $\|\mu \otimes \nu\|$  en fonction de  $\|\mu\|$  et  $\|\nu\|$ .

**c.** Que peut-on dire de l'application  $(\mu, \nu) \mapsto \mu \otimes \nu$  ?

Dans la suite,  $\mathcal{E}$  désigne l'image de  $M(I) \times M(I)$  par cette application.

**II.3. a.** Soit  $\lambda \in \mathcal{E}$ ,  $\lambda \neq 0$ . Montrer qu'il existe  $\alpha \in \mathcal{C}(I)$  et  $\beta \in \mathcal{C}(I)$  tels que

$$\lambda(\alpha \otimes \beta) = 1.$$

Montrer que pour tout couple  $(\alpha, \beta)$  de  $\mathcal{C}(I) \times \mathcal{C}(I)$  vérifiant cette condition,

$$\lambda = p_\beta(\lambda) \otimes q_\alpha(\lambda).$$

**b.** Soit  $\lambda = \delta_0 \otimes \delta_0 + \delta_1 \otimes \delta_1$ .

On considère  $\theta \in \mathcal{C}(I)$  défini par  $\forall x \in I, \theta(x) = x$ .

Calculer  $p_\theta(\lambda)$  et  $q_\theta(\lambda)$ .

**c.**  $\mathcal{E}$  est-il un sous-espace vectoriel de  $M(I^2)$  ?

## TROISIÈME PARTIE

Dans cette partie,  $\varphi$  désigne une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$ , périodique de période 1, prenant ses valeurs dans  $I$ .

**III.1.** On pose

$$a_n = \int_0^1 \sqrt{1 + [n\varphi'(nx)]^2} dx.$$

Quelle interprétation géométrique peut-on donner du nombre  $a_n$  ?

Montrer que la suite  $(\frac{a_n}{n})_{n \in \mathbb{N}^*}$  a une limite  $l$ .

Exprimer  $l$  à l'aide d'une intégrale.

**III.2.** Pour tout  $g \in \mathcal{C}(I)$ , on pose

$$\nu(g) = \int_0^1 g[\varphi(x)] |\varphi'(x)| dx$$

et pour tout entier  $n \geq 1$

$$\nu_n(g) = \frac{1}{n} \int_0^1 g[\varphi(nx)] \sqrt{1 + [n\varphi'(nx)]^2} dx.$$

Montrer que  $\nu$  et  $\nu_n$  appartiennent à  $M(I)$ .

Montrer que la suite  $(\nu_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  admet  $\nu$  pour limite dans l'espace vectoriel normé  $M(I)$ .

**III.3.** Soit  $F \in \mathcal{C}(I^2)$ . Montrer que pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe un entier  $N$  tel que les conditions  $n > N$  et  $0 \leq k < n$ ,  $(n, k) \in \mathbb{N}^2$ , impliquent  $|\Delta_{n,k}| < \varepsilon$  où  $\Delta_{n,k}$  désigne la différence

$$\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} F[x, \varphi(nx)] \sqrt{1 + [n\varphi'(nx)]^2} dx - \nu \left[ F \left( \frac{k}{n}, \cdot \right) \right].$$

(On pourra poser  $\omega_{n,k}(F) = \int_{k/n}^{(k+1)/n} F(x, \varphi(nx)) \sqrt{1 + n^2 \varphi'(nx)^2} dx$ .)

**III.4.** Pour tout  $F \in \mathcal{C}(I^2)$  et tout entier  $n \geq 1$ , on pose :

$$\lambda_n(F) = \frac{1}{n} \int_0^1 F[x, \varphi(nx)] \sqrt{1 + [n\varphi'(nx)]^2} dx.$$

Montrer que  $\lambda_n$  appartient à  $M(I^2)$ .

Montrer qu'il existe  $\lambda \in M(I^2)$  tel que, pour tout  $F \in \mathcal{C}(I^2)$ ,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda_n(F) = \lambda(F).$$

Montrer que  $\lambda$  appartient à l'ensemble  $\mathcal{E}$  défini dans II.

#### QUATRIÈME PARTIE

Dans cette partie,  $\varphi$  désigne une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$ , prenant ses valeurs dans  $I$ . On se propose d'étudier  $\nu \in M(I)$  défini par la formule :

$$\forall f \in \mathcal{C}(I), \nu(f) = \int_0^1 f[\varphi(x)] |\varphi'(x)| dx.$$

**IV.1.** Montrer que si  $\varphi$  est monotone, il existe deux réels  $a_1, a_2$  tels que

$$0 \leq a_1 \leq a_2 \leq 1 \text{ et } \forall f \in \mathcal{C}(I), \nu(f) = \int_{a_1}^{a_2} f(x) dx.$$

**IV.2.** On suppose dans cette question que l'équation  $\varphi'(x) = 0$  n'a qu'un nombre fini de racines dans  $I$ . Montrer qu'il existe une fonction en escalier  $\psi$  définie sur  $I$  et prenant ses valeurs dans  $\mathbb{N}$ , telle que

$$\forall f \in \mathcal{C}(I), \nu(f) = \int_0^1 f(x) \psi(x) dx.$$

**IV.3.** Soit  $\varphi_0$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$\begin{cases} \varphi_0(x) = \sin^2(2\pi x) & \text{pour } \frac{1}{2} < x < 1, \\ \varphi_0(x) = 0 & \text{pour } x \leq \frac{1}{2} \text{ ou } x \geq 1. \end{cases}$$

Soit  $(\alpha_k)$  une suite *décroissante* de réels telle que

$$\forall k \in \mathbb{N}, \alpha_k \in ]0, 1] \text{ et } \lim_{k \rightarrow +\infty} \alpha_k = 0.$$

Pour tout  $n \geq 1$ , on pose :

$$\varphi_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{\alpha_k}{2^k} \varphi_0(2^k x).$$

- a. Tracer le graphe de  $\varphi_2$  dans le cas  $\alpha_0 = \alpha_1 = \alpha_2 = 1$ .  
 b. Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\varphi_n$  est une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  prenant ses valeurs dans  $I$  et qu'il existe une fonction en escalier  $\psi_n$  définie sur  $I$  et prenant ses valeurs dans  $\mathbb{N}$  telle que

$$\forall f \in \mathcal{C}(I), \int_0^1 f[\varphi_n(x)] |\varphi_n'(x)| dx = \int_0^1 f(x) \psi_n(x) dx.$$

Expliciter  $\psi_2$  associée à la fonction  $\varphi_2$  du a.

Exprimer  $\gamma_n = \int_0^1 \psi_n(x) dx$  en fonction des  $\alpha_k$ .

- c. Montrer que la suite  $(\varphi_n)$  converge uniformément sur  $I$ , que sa limite est de classe  $\mathcal{C}^1$  et prend ses valeurs dans  $I$ . Étudier la convergence de la suite  $(\gamma_n)$ .  
 d. Si  $\varphi$  est la limite de la suite  $(\varphi_n)$ , montrer qu'il existe une fonction  $\psi$  définie sur  $I$  et prenant ses valeurs dans  $\mathbb{N}$ , intégrable sur tout intervalle  $[\varepsilon, 1]$  où  $\varepsilon \in ]0, 1[$  et telle que :

$$(i) \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon}^1 \psi(x) dx \text{ existe,}$$

$$(ii) \forall f \in \mathcal{C}(I), \nu(f) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon}^1 \psi(x) f(x) dx$$

$$\text{(noté plus simplement } \nu(f) = \int_0^1 \psi(x) f(x) dx \text{).}$$